

# BILTEN AGROFUTURA 6

Mjesečni bilten izdaje Gospodarska škola - projekt financiran od strane Europske unije  
IPA Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007-2009 Implementacija novih kurikuluma-AGROFUTURA

N°1

Sve ostale zaperke odstranjujemo sa primarnih stabala.



Trajanje uzgoja je obično od 6 mjeseci, s razvojem 8-10 cvjetnih grana, do 11 mjeseci s razvojem 18-20 cvjetnih grana. Kod dužeg perioda uzgoja odstranjuju se donji neaktivni listovi (3 lista tjedno). Ostale mјere, kao dodatno opršavanje pomoću bumbara omogućavaju bolju oplodnju kad su temperature niske. Moguće je i primjena hormonskih preparata.



Najčešći objekti u kojima se vrši uzgoj su platenici, jer je moguće sa dopunskim mjerama opskrbe (zagrijavanje, prozračivanje, fertirigacija) održavati duže vrijeme povoljne uvjete rasta. Ukoliko je uzgoj preko cijele godine, moguće je dvostrukim folijama lakše zagrijati prostor. Preko ljeta kod visokih temperatura, izbjeljuju se vanjske stranice platenika kako bi se svjetlost odbijala, a moguće je i orošavanje biljaka kako bi se osvježile. Prinosi su ovisni o hibridima, tehnici uzgoja i vrsti objekata. Kod dugog uzgoja (11 mjeseci) moguće je postići 30-35 kg/m<sup>2</sup>. Kod kratkog uzgoja (6 mjeseci) se prinosi 15-20 kg/m<sup>2</sup> kod debeloplodne, a 10-15 kg kod sitnoplodne raze.



## Sortiment

### Rally F1

Rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih (>250g), mesnatih i ukusnih plodova. Hibrid ima veoma snažan korjenov sistem, otporan na nematode.



### dugog razdoblja berbe. Cherry Belle F1



### Fado F1

Štalanj je i hibrid Fado koji stvara obilje cherry raze u grozdovima tijekom



### Monroe F1

